

安全文化护理对儿科病房护理风险的有效防范

常 静

西安医学院第二附属医院儿科 陕西西安

【摘要】目的 探讨安全文化护理对儿科病房护理风险的有效防范。**方法** 对我院儿科病房 2020 年 1 月至 2021 年 1 月收治的 80 例发生护理风险事件的患儿的临床资料进行统计分析,依据护理方法将这些患儿分为安全文化护理组 (n=40) 和常规基础护理组 (n=40) 两组,常规基础护理组患儿接受常规基础护理,安全文化护理组患儿接受常规基础护理联合安全文化护理,然后对两组患儿的护理风险再次发生情况进行统计分析。**结果** 安全文化护理组患儿的护理风险再次发生率 10.0% (4/40) 显著低于常规基础护理组 27.5% (11/40) ($P<0.05$)。**结论** 安全文化护理能够有效防范儿科病房护理风险。

【关键词】 安全文化护理; 儿科病房; 护理风险; 有效防范

Safe Culture Nursing Effectively Prevents Nursing Risks in Pediatric Wards

Jing Chang

Department of Pediatrics, The Second Affiliated Hospital of Xi'an Medical College, Xi'an, Shaanxi, China

【Abstract】 Objective: To explore the effective prevention of nursing risks in pediatric wards by safe culture nursing. **Methods** The clinical data of 80 children with nursing risk events admitted to the pediatric ward of our hospital from January 2020 to January 2021 were statistically analyzed, and these children were divided into safety culture nursing groups according to the nursing methods (n=40) And the conventional basic nursing group (n=40). The children in the conventional basic nursing group received conventional basic nursing, and the children in the safety culture nursing group received conventional basic nursing combined with safety culture nursing, and then the nursing risk of the two groups of children was again Perform statistical analysis on the occurrence. **Results** The nursing risk recurrence rate of children in the safety culture nursing group was 10.0% (4/40), which was significantly lower than that of the routine basic nursing group, 27.5% (11/40) ($P<0.05$). **Conclusion** Safety culture nursing can effectively prevent nursing risks in pediatric wards.

【Keywords】 Safety Culture Nursing; Pediatric Ward; Nursing Risk; Effective Prevention

护理管理应该给予安全文化护理以充分重视,从而对医疗服务需求进行有效适应^[1]。儿科病房具有较为特殊的群体,0-14岁患儿是主体,因此临床很有必要做好病房的护理管理工作^[2]。向儿科护理人员的意识中灌输安全文化理念能够使其在工作中对安全风险进行回避,将更优质的护理服务提供给患儿,从而促进患儿及其家属护理满意度的提升^[3]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

对我院儿科病房 2020 年 1 月至 2021 年 1 月收治的 80 例发生护理风险事件的患儿的临床资料进

行统计分析,纳入标准:所有患儿均发生护理风险事件;排除标准:将无法对研究进行有效配合等患儿排除在外。依据护理方法将这些患儿分为安全文化护理组 (n=40) 和常规基础护理组 (n=40) 两组。安全文化护理组患儿中男性 17 例 (42.5%), 女性 23 例 (57.5%), 年龄 2 个月-5 岁,平均 (2.6±0.2) 岁。在疾病类型方面,支气管炎 17 例 (42.5%), 上呼吸道感染 15 例 (37.5%), 肺炎 8 例 (20.0%)。常规基础护理组患儿中男性 18 例 (45.0%), 女性 22 例 (55.0%), 年龄 1 个月-5 岁,平均 (2.2±0.4) 岁。在疾病类型方面,支气管炎 18 例 (45.0%),

上呼吸道感染 13 例 (32.5%)，肺炎 9 例 (22.5%)。两组患儿的一般资料比较差异均无统计学意义 ($P>0.05$)，具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规基础护理组

依据患儿的具体病情给予其有个体化的护理。

1.2.2 安全文化护理组

1) 输液过程中加强防范护理风险。加强给予临床护理人员安全护理的力度，将良好的前提条件提供给临床护理人员安全意识的增强，在患儿静脉滴注过程中加强巡视及护理力度，积极和患儿家属交流。用药过程中认真核对，明确掌握药物作用机理，密切关注滴注速度；2) 加强组织管理，对护理安全管理制度进行完善。临床护理人员应该将患儿家属对护理工作的意见反馈认真吸取过来，对相关管理制度进行完善，从而最大限度地降低护理风险；3) 给予专业理论及技术操作培训以充分重视。护理工作正常开展的基本条件为专业知识及操作技能，其在极大程度上保证了安全护理。因此，医院应该加强培训临床护理人员专业知识及操作技能的力度，促进临床护理人员护理水平的提升，从而将护理风险降低到最低限度；4) 促进护理人员岗位责任感及服务意识的提升；5) 促进临床护理人员法律意识的

提升。对法律常识有一个清晰了解，具备基本的自我保护意识，对应急处理能力进行强化，从而促进安全防范意识的显著提升。

1.3 观察指标

护理风险再次发生情况、发生原因。

1.4 统计学分析

使用 SPSS20.0 统计学软件进行分析，计量资料用 ($\bar{x} \pm s$) 表示，比较采用 t 检验，重复测量的计量资料进行方差分析，计数资料以率 (%) 表示，比较采用卡方检验， $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿的一般资料比较

两组患儿的一般资料比较差异均无统计学意义 ($P>0.05$)，具体见表 1。

2.2 两组患儿的护理风险再次发生情况比较

安全文化护理组患儿中候诊风险 1 例，护理失误 1 例，意外事件 1 例，沟通解释 1 例，护理风险再次发生率为 10.0% (4/40)；常规基础护理组患儿中候诊风险 2 例，护理失误 3 例，意外事件 2 例，诊疗效果 1 例，沟通解释 1 例，环境布局 1 例，法律意识 1 例，护理风险再次发生率为 27.5% (11/40)。安全文化护理组患儿的护理风险再次发生率显著低于常规基础护理组 ($P<0.05$)，具体见表 2。

表 1 两组患儿的一般资料比较

项目	分类	安全文化护理组 (n=40)	常规基础护理组 (n=40)	t/x^2	P
性别	男性	17 (42.5)	18 (45.0)	1.32	>0.05
	女性	23 (57.5)	22 (55.0)		
年龄 (岁)		2.6 ± 0.2	2.2 ± 0.4	1.886	>0.05
疾病类型	支气管炎	17 (42.5)	18 (45.0)	2.77	>0.05
	上呼吸道感染	15 (37.5)	13 (32.5)		
	肺炎	8 (20.0)	9 (22.5)		

表 2 两组患儿的护理风险再次发生情况比较 (例/%)

项目	安全文化护理组 (n=40)	常规基础护理组 (n=40)	x^2	P
候诊风险	1 (2.5)	2 (5.0)	11.14	<0.05
护理失误	1 (2.5)	3 (7.5)		
意外事件	1 (2.5)	2 (5.0)		
诊疗效果	0 (0)	1 (2.5)		
沟通解释	1 (2.5)	1 (2.5)		
环境布局	0 (0)	1 (2.5)		
法律意识	0 (0)	1 (2.5)		
总计	4 (10.0) *	11 (27.5)		

注：与常规基础护理组比较，* $P<0.05$

3 讨论

在儿科病房护理中引入安全文化理念能够促进护理人员安全意识的有效提升,对其服务理念进行改进,加强培训临床护理人员专业技能的力度,促进患儿及其家属护理满意度的提升^[4]。相关医学研究表明^[5-6],在护理管理措施中引入安全文化管理理念能够促进儿科护理管理效果的提升、临床护理人员安全意识的增强,做好风险防范,促进服务质量的提升,从而使患儿的安全及健康得到切实有效的保证。本研究结果表明,安全文化护理组患儿中候诊风险 1 例,护理失误 1 例,意外事件 1 例,沟通解释 1 例,护理风险再次发生率为 10.0% (4/40);常规基础护理组患儿中候诊风险 2 例,护理失误 3 例,意外事件 2 例,诊疗效果 1 例,沟通解释 1 例,环境布局 1 例,法律意识 1 例,护理风险再次发生率为 27.5% (11/40)。安全文化护理组患儿的护理风险再次发生率显著低于常规基础护理组 ($P<0.05$),和上述相关医学研究结果一致。

综上所述,安全文化护理能够有效防范儿科病房护理风险,值得在临床推广应用。

参考文献

[1] 张彩凤,刘可,闫影影,等.儿科护理不良事件报告意向及

影响因素分析[J].中国卫生质量管理,2021,28(1):46-49.

- [2] 何英霞,金姐,张明智.儿童疫苗接种家长态度问卷(PACV)的汉化和信效度研究[J].复旦学报(医学版),2020,47(3):434-438.
- [3] 宋阳光,薛莹莹.探讨护理安全在儿科护理工作的重要性[J].首都食品与医药,2019,26(2):79-80.
- [4] 张静.54 例儿科护理不良事件的分析及干预对策[J].当代护士(下旬刊),2019,26(9):25-27.
- [5] 雷若冰,蒋小平,林楠,等.ICU 患者身体约束替代措施的证据总结[J].护理学杂志,2019,34(14):101-104,108.
- [6] 赵月梅,马贺贺.老年病房护理管理中安全文化的应用效果观察[J].中国卫生产业,2019,16(33):87-88,91.

收稿日期: 2021 年 3 月 9 日

出刊日期: 2021 年 4 月 12 日

引用本文: 常静,安全文化护理对儿科病房护理风险的有效防范[J].当代护理,2021,2(2):32-34.
DOI: 10.12208/j.cn.20210037

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2021 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS